Gestion alimentaire des poulets de chair

Gestion des poulets de chair

La croissance la plus efficace
est obtenue lorsque le volaille a une faible maintenance et un faible dépôt de
graisse entre 0 et 14 jours, tandis que la croissance la moins efficace est
obtenue lorsque le poulet a une maintenance élevée et un dépôt de graisse plus
important entre 28 et 42 jours. Le pré-amorçage doit favoriser le développement
de l'intestin et du foie, d'où la nécessité d'utiliser le pré-amorçage de 0 à 7
jours sans aucune restriction sur le support ou dans des assiettes d'alimentation.

De même, les poussins doivent
être nourris avec un aliment de démarrage entre le 8e et le 14e jour pour une
croissance optimale et le développement des plumes. Cependant, à partir du 28e
jour et jusqu'à l'abattage, les volailles consomment plus d'énergie pour leur
entretien et le dépôt de graisse, ce qui réduit l'efficacité de la phase
d'engraissement. Utilisez l'aliment de démarrage dans la phase de démarrage,
l'aliment de croissance dans la phase de croissance et l'aliment de finition
dans la phase de finition en veillant à ce que le nombre de mangeoires soit
suffisant pour une croissance uniforme, les poulets ne devant

pas s’éloigner de
plus de 2 m de la mangeoire.

De même, calculez le nombre de
mangeoires nécessaires pour le nombre de volailles en fonction de la capacité du
mangeoire. La consommation d’aliments augmentant quotidiennement, il convient
d’équilibrer les mangeoires et les abreuvoirs afin d’éviter les mouvements
inutiles des animaux et le gaspillage d’aliments en ajustant la hauteur des
mangeoires.

En plus, ne remplissez jamais
trop les mangeoires pour éviter les rongeurs et assurez-vous que la nourriture
est disponible pendant 20 heures par jour. Pour les lumières artificielles,
éteignez-les pendant 4 heures sur 24, puis rallumez-les.

Enfin, la nourriture et l’eau
doivent être disponibles.