Huit maladies courantes des poules et leur traitement naturel

Maladie et traitement

La variole sèche et la variole humide affectent les plumages et les caroncules, tandis que la variole humide affecte le système respiratoire. Pour traiter la variole, il faut couper et frotter les plaies avec du citron, et appliquer un mélange de miel, de palme ou de pâte dentifrice sur les plaies. Deuxièmement, la maladie du coryza infectieux peut être traitée en écrasant de l'ail et du gingembre dans un rapport de 1:4, en ajoutant du citron et du miel dans un rapport de 1:1, et en mélangeant 150 ml de ce mélange par litre d'eau potable. Troisièmement, la coccidiose est traitée en écrasant de l'ail et en l'ajoutant ensuite à l'eau de boisson des poules. On peut également ajouter 150 grammes de farine des feuilles de papayer par kilo d'aliments ou 0,5 gramme de poudre de thé vert par kilo d'aliments. En outre, la maladie de Newcastle est traitée en ajoutant 10 cuillères à café de piment, 1 cuillère à café de cendres dans de l'eau et de l'aloe vera et en les donnant aux poules. Enfin, les parasites peuvent être traités en appliquant de

la terre de diatomée.

Signes et symptômes

La variole aviaire se caractérise par des plaies sur les crêtes et les caroncules, une perte de poids, une faible production d'œufs, une dépression et un plumage rugueux. Deuxièmement, le coryza infectieux se caractérise par des plaies dans la bouche, une perte de poids et une faible consommation d'aliments. Troisièmement, la coccidiose se caractérise par des fientes sanglantes, un abattement, une faible consommation d'aliments et la mort. En outre, la maladie de Newcastle se caractérise par une diarrhée verdâtre, des œufs à coquille mince, des plumes ébouriffées, une torsion du cou, une toux et des éternuements. Enfin, les parasites provoquent des anémies et transmettent des infections.