

Kilimo cha Uturuki

Kwa kuwa biashara ya kilimo yenye faida kubwa, ufugaji wa Uturuki bado uko chini. Ubora na wingi wa batamzinga zinazozalishwa huamuliwa na aina na kiwango cha teknolojia inayotumika katika mchakato huo.

Ufugaji wa Uturuki unafanywa kwa ajili ya shughuli na madhumuni kwani aina kuu ni pamoja na kubwa, za kati na ndogo ambazo mifugo ya aina kubwa ni pana, shaba iliyonyolewa na nyeupe yenye matiti mapana. Batamzinga hupenda lishe ya kijani kwani tom hupata kilo 8-10 huku kuku hupata kilo 6-7 kwa muda wa miezi 8 chini ya usimamizi mzuri.

Usimamizi wa Uturuki

Kwa vile uwezo wa kustahimili magonjwa ya batamzinga ni mzuri, vibanda vya kuku wa nyama vya urefu wa futi 12 na madirisha makubwa yenye matundu pande zote mbili hutumika. Mzunguko wa hewa ni muhimu ili kuzuia ukuaji wa magonjwa ya kupumua na mtiririko wa matope ni bora kwani inachukua unyevu.

Pili, kitanda cha lita kiwe na kina cha inchi 6. Vilisho na vyombo vya maji vinapotumiwa, ndege waliokomaa kabisa wanahitaji nafasi ya futi 3-4 za mraba kwenye kivuli na katika hili, batamzinga hufikia ukomavu wa kijinsia wakiwa na umri wa wiki 30. Kupandisha asili kunaruhusiwa na uwiano wa mwanaume na mwanamke ni 1:5. Kila jike hutaga mayai 80-90 kwa mwaka na kila yai lina uzito wa 80g na hakuna msimu maalum wa kutaga mayai. Kusanya mayai kila saa kwani ndege wanaweza kuharibu. Uturuki hukaa kwa wiki 24.

Usimamizi wa mayai

Hifadhi mayai mahali pa baridi kwa siku 2-3 au kwenye jokofu kwa wiki. Tumia hatchery kwa uzalishaji mkubwa wa vifaranga. Uanguaji wa yai huchukua siku 28 kwa wastani wa 65-70%. Kifaranga wa siku ana uzito wa 50g na kutaga huchukua wiki 4 na wiki 6 katika majira ya baridi na katika hili,

kutoa digrii 95 fahrenheit mwanzoni na kupunguza kwa kiwango cha 5 digrii fahrenheit kwa wiki kwa wiki 4.

Kulisha Uturuki

Miezi 2 ya awali ni muhimu kwani vifo ni hadi 6-10% kwa hivyo hitaji la utunzaji wa kutosha wa ulishaji wa kuku. Weka maganda ya mpunga kwenye sakafu na uichunge mara moja kwa siku 2 ili kuepuka kupepesuka na funika madirisha katika maeneo yenye kasi ya juu ya siku ya upepo na upepo. Ongeza nafasi ya sakafu kulingana na ukuaji wa ndege na weka malisho ya kutosha na maji. Lisha kuku kwa mwezi 1 na chakula cha kuku kilichotengenezwa tayari na katika hatua ya baadaye, chakula cha 25% na 75% ya kijani. Ardhi ya malisho inapaswa kuwa na nafasi ya kutosha. Lishe yenye protini huwafanya ndege kukua na afya na kulisha 30-40g ya makombora huongeza kalsiamu na kuimarisha miguu yao. Shikilia ndege kwa miguu na mdomo, chanja na kudumisha mzunguko wa hewa na usafi.