La culture des carottes de manière rentable Partie 1

Les carottes sont très sensibles aux températures extrêmement élevées. En revanche, les températures inférieures à 10 degrés Celsius donnent des carottes longues et minces.

En outre, les carottes doivent être conservées dans des caisses dans un endroit ventilé pour éviter la pourriture et le développement de moisissures. Pour obtenir un rendement maximal, les carottes ont besoin d'un sol sablonneux meuble, neutre et alcalin, bien drainé. En outre, les exploitations de carottes doivent être installées dans des zones ensoleillées et peu ombragées, à une température optimale comprise entre 16 et 24 degrés Celsius. Plusieurs conditions sont requises pour démarrer une exploitation de carottes, parmi lesquelles le terrain, les semences et les engrais.

Culture de la carotte

Commencez par préparer soigneusement le terrain et, lors de la plantation, ne plantez que des graines certifiées à 6 mm de profondeur et à 5 cm d'intervalle, puis recouvrez d'une fine couche de terre. Vous pouvez également semer les graines à la volée, mais cela rend le contrôle des mauvaises herbes très difficile. En outre, paillez les champs de carottes pour préserver l'humidité du sol et

appliquez du compost
décomposé avant la plantation.

Gestion et récolte

Irriguez toujours les cultures le
matin et le soir et paillez-les pour préserver l'humidité du sol. Appliquez
également du compost décomposé et couvrez par des feuilles du palmier pour
maintenir le sol humide, évitez la lumière directe du soleil et l'éclatement
des graines pendant l'irrigation. En outre, il faut arroser doucement les
jeunes plants et enlever les particules du sol compactées pour favoriser la
germination des graines. Enfin, la récolte doit avoir lieu 2 à 3 mois après la
plantation, lorsque les racines ont un diamètre de 3 cm.

Ravageurs et maladies

Les pucerons se trouvent sous les
feuilles, ils provoquent un retard de croissance et un jaunissement des
feuilles et peuvent être contrôlés efficacement en utilisant des variétés
tolérantes et des insecticides. En outre, le charançon de la carotte est
contrôlé par l'élimination des résidus des cultures et par la rotation des
cultures. Aussi, la brûlure des feuilles qui provoque un jaunissement des
feuilles est combattue par des fongicides. De même, la pourriture noire des
racines résulte d'une utilisation trop importante du compost.

Enfin, le mildiou
est contrôlé par un espacement approprié et la rotation des cultures.