La gestion de la maladie des taches brunes des feuilles dans les plantations rizicoles

La maladie des taches brunes de la feuille du riz est transmise par les semences
et lorsqu'elle attaque les champs rizicoles, les rendements deviennent faibles,
surtout dans les champs irrigués, ce qui entraîne de faibles profits et affecte
négativement les revenus des agriculteurs.

La maladie affecte les semences, les feuilles, les tiges ainsi que les
grains, de sorte qu'une détection précoce et l'application de mécanismes de
contrôle sont très bénéfiques. En plus, la maladie de la tache brune des
feuilles est une maladie fongique qui provoque une décoloration des feuilles et
des taches brunes. La maladie est généralement causée par des techniques inadéquates
de préparation du sol.

La propagation de la maladie

La maladie des taches brunes se propage généralement par le biais de
semences infectées, c'est pourquoi il est fortement recommandé d'utiliser des

semences certifiées. En plus, il faut toujours traiter les semences en les
trempant dans de l’eau tiède ou dans une solution fongicide avant de les
planter, car cela permet de les protéger.

La gestion de la maladie

Assurez une bonne préparation du terrain en le nivelant, afin d’empêcher la
stagnation de l’eau et d’éviter les mauvaises herbes qui entrent en compétition
pour les nutriments de la plante. En outre, il convient de planter chaque
saison des semences certifiées provenant des vendeurs de produits agricoles
certifiés. Veillez également à ce que les champs de riz soient exempts de
mauvaises herbes afin d’éviter la propagation des maladies et utilisez toujours
une nutrition équilibrée pour les plantes après l’échantillonnage du sol afin
de garantir une bonne croissance des cultures. En plus, irriguez les champs rizicoles
et surveillez régulièrement ces derniers afin d’identifier facilement les
cultures affectées. Enfin, il convient d’enlever et de détruire les plantes affectées
et d’appliquer les fongicides recommandés.