

# »Magonjwa na vimelea vyanguruwe, na jinsi ya kuvividhibiti katika shamba lako«

Vimelea vimegawanywa katika makundi mawili: Vimelea vyatya ndani. Vimelea vyatya ndani huishi ndani ya mwili wa mtu au mnyama.

Vimelea vyatya ndani huishi ndani ya mwili wa mnyama na hawaonekani. Wanaweza tu kutambuliwa kutokana na athari zao kwa wanyama. Aina tofauti za vimelea vyatya ndani ni minyoo na kosidia.

## Minyoo

Kosidia ni vimelea vidogo ambavyo hukaa ndani ya matumbo ya nguruwe na huzuia matumbo kuingiza chakula.

Minyoo imegawanywa katika safuri, mchango duara, na tegu. Mchango duara humezwa kama mayai au mabuu kupitia vyakula vilivyochoafuliwa na maji katika. Haya husababisha ubadilishaji duni wa chakula, na hivyo kusababisha ukuaji duni wa nguruwe.

Minyoo ya mapafu huziba mapafu, na hivyo kufanya nguruwe kukohoa mara kwa mara.

## Minyoo tegu

Mwili wa tegu una sehemu kama kidole cha binadamu. Kila sehemu hukatika kadiri mnyoo anavyokua.

Minyoo ya tegu hunyonya damu kutoka kwa nguruwe na kuwafanya kuwa dhaifu. Nguruwe wanaposhambuliwa na minyoo hawakui, kinga yao huanza kushuka na kukabiliwa na upungufu wa damu.

Unaweza kupata minyoo au vipande vyake kwenye kinyesi cha nguruwe.

## Kuzuia minyoo

Minyoo inaweza kupatikana kwenye tumbo. Hakikisha chakula na maji havijachafuliwa.

Tumia njia ya mrija na mabomba ili kunyweshea mifugo badala ya vihori vya maji ili kuwazuia nguruwe kuchafua maji. Katika hali ambapo mtu hawesi kumudu mrija na mabomba, tumia maji vihori vyembamba vya maji na chakula.

Wasiliana na daktari wa mifugo kwa miezi 2–3 ili wapewe dawa ya kuua minyoo mara kwa mara. Vimelea vya ndani hupatikana sana miezi 2–3 baada ya kuachisha nguruwe kunyonyesha.