Manipulation des vaccins à virus inactivés; Dosage; Administration – Bœuf

Étant l'un des facteurs qui influencent l'élevage, la santé de l'animal
détermine la qualité et la quantité des produits obtenus à partir des animaux.

Le succès des vaccins à virus inactivés dépend de la capacité de l'animal à réagir
au vaccin, ainsi que de la manipulation et de l'administration correcte du
vaccin. Les vaccins à virus inactivés sont mis en bouteille en fonction de la dose
nécessaire.

L'administration de la vaccination

Le premier vaccin à virus inactivé est un
vaccin prêt à l'emploi qui ne nécessite aucun mélange et qui doit donc être
protégé de la chaleur, de la lumière solaire et du froid extrême de la température de la congélation lors de
son stockage. Conservez au réfrigérateur entre 35 et 40 degrés Fahrenheit et
pendant l'administration, conservez les seringues de terrain dans une glacière
qui bloque la lumière solaire et les
protège contre les températures extrêmes.

De même, évitez d'administrer le vaccin lorsque la vache est mouillée ou

sale. Avant d’utiliser le vaccin, secouez doucement le flacon pour répartir
uniformément les composants du vaccin. Tout en utilisant une main pour incliner
le flacon, tenez la seringue dans l’autre main et insérez l’aiguille au centre
du bouchon en caoutchouc. Insérez le
haut de la seringue dans le flacon pour prélever la dose du vaccin souhaitée,
puis retirez l’aiguille du flacon et éliminez l’air de la seringue.

Avant l’administration, immobilisez l’animal et localisez le point
d’injection sous le ligament nucal, en avant de l’épaule et loin des ganglions
lymphatiques. Rassurez-vous que la zone est propre et exempte de déchets.

En outre, pour l’injection sous-cutanée, utilisez une nouvelle aiguille
stérile et, après avoir déterminé le site, tirez sur la peau du cou de l’animal
pour créer une tente où l’aiguille est placée à sa base tout en veillant à ne
pas l’orienter vers le muscle. Après l’administration du vaccin, retirez
l’aiguille et relâchez la peau.

Après la vaccination, nettoyez les seringues avec de l’eau bouillante et
n’utilisez pas de désinfectants. Utilisez une seringue multi dose pour le même
produit à chaque fois et étiquetez chaque seringue pour indiquer son contenu.

Enfin, pour obtenir les meilleurs résultats, le vaccin à

virus inactivé doit être utilisé lorsqu’il est ouvert et les aiguilles doivent être éliminées conformément à la réglementation.