

Production commerciale et gestion des choux – Bien le faire, partie 2

La multiplication est l'obtention d'un spécimen de plante ou d'animal par un processus naturel à partir de la tige parentale. La multiplication d'une nouvelle culture peut se faire à partir d'une graine avant de transplanter la plantule sur un champ.

Les graines de chou sont placées dans une pépinière avant d'être plantées dans la ferme. Elles restent dans la pépinière pendant trois à quatre semaines en fonction de la région. Dans les régions chaudes, la période est plus courte, tandis que dans les régions froides, elle est plus longue.

Plantation des choux

Lors de la plantation, éparpillez les graines de manière à ce qu'elles ne soient pas trop proches les unes des autres, car elles risqueraient de brûler. Après avoir établi les lignes, paillez et arrosez. La pépinière doit être proche du jardin principal pour éviter d'endommager les plantules lors de la transplantation.

La source d'eau doit être proche pour l'irrigation. La pépinière doit être protégée contre des vents forts et ne doit pas être située sur une pente pour éviter l'érosion.

Les plantules de chou

Surveillez les parasites et contrôlez-les lorsque les plantules sont en train de pousser. Après 4 semaines, le chou est prêt à être repiqué. Paillez le lit de semis pour réduire l'évaporation et conserver de l'eau au sol pendant longtemps.

Laissez des espaces entre les plates-formes des plantules pour faciliter les déplacements en cas de lutte contre les mauvaises herbes, les ravageurs et l'irrigation. Pour les variétés plus petites, les agriculteurs doivent réduire la mesure, l'espacement est fonction de la taille du chou et détermine la taille de votre objectif.

Plantation

Lors du repiquage, utilisez un engrais en fonction de la salinité de votre sol pour que les nutriments puissent pénétrer dans le sol. Le chou repiqué prend jusqu'à 90 jours pour arriver à maturité. Arrosez correctement pour que le sol soit humide.

Utilisez des pesticides pour lutter contre les parasites tels que la mouche de la racine et le ver de terre. Les choux sont conservés à l'abri du soleil et dans un endroit frais.