

Uingizaji Bandia wa Baada ya Mshipa wa Kizazi kwenye Nguruwe AS-623-WV

Kuwa chanzo kizuri cha protini, ubora na wingi wa nguruwe wanaozalishwa shambani huamuliwa na aina ya teknolojia inayotumika.

Kwa kuwa ni kuzaliana kwa wanyama katika hali ya kutokuwepo kwa dume, katika upandishaji mbegu bandia hukusanywa kutoka kwa mwanamume hadi jike na fundi binadamu. Katheta za Kienyeji za Kuingiza mbegu za kiume zimeundwa kuweka shahawa kwenye seviksi.

Utunzaji wa mbegu

Kwa vile catheta za PCAI zimeundwa kuweka shahawa kwenye mwili wa uterasi, wakati wa mchakato huo ncha ya ond ya catheta huingizwa kwenye uke kupitia uke hadi sehemu za seviksi na catheta ndogo husukumwa kupitia catheta ya nje kupita sehemu ya seviksi hadi kwenye mwili wa uterasi. hatimaye inawekwa.

Vile vile, fimbo ya PCAI huingizwa kwa pembe ya digrii 45 ndani ya uke kupitia uke ili kufungia ndani ya seviksi na wakati wa mchakato, mnyama mnyama haipaswi kuwepo na ikiwa kuna haja, mafuta yanaweza kutumika kwenye catheter ya nje. Thibitisha kuwa fimbo iko kwenye seviksi kwa kugeuka saa na kurudi nyuma kwa upole bila upinzani.

Pakia catheta za ndani kwenye chapa ya catheta ya nje ili kubaini umbali wa kuendeleza catheta ya ndani. Seviksi kupumzika kwa sekunde 20 inaruhusu catheter ya ndani kuwekwa na dozi ya shahawa inaweza kuunganishwa hadi mwisho wa catheta ya ndani na shinikizo kidogo linaasisitizwa kwenye chupa ya shahawa.

Zaidi ya hayo, mara tu dozi inapowekwa, mfuko wa chupa unaweza kutolewa ili kuruhusu hewa kuingia na hatimaye mara tu shahawa zikiwekwa, catheter hutolewa wakati huo huo na kuchunguzwa kwa damu.